

## دیلاتاسیون و کورتاژ

### دیلاتاسیون و کورتاژ

باز کردن دهانه رحم و تخلیه نسج آن را دیلاتاسیون گویند. این عمل یکی از شایع ترین عمل زنان میباشد.

میتواند برای تشخیص یا درمان خونریزی های غیر طبیعی زنان به کار رود.

### خونریزی غیر طبیعی از واژن چیست؟

در شرایط مختلف یک زن ممکن است مشکلاتی داشته باشد که منجر به خونریزی غیر طبیعی از واژن گردد. خونریزی غیر طبیعی به خونریزی گفته میشود که در زمان خارج از انتظار ما اتفاق بی افتد.

1

### عمل دیلاتاسیون

این عمل ضمن بیهوشی عمومی یا بی حسی ناحیه ای بعد از اینکه بیمار را در وضعیت مناسبی قرار دادن که دسترسی به رحم آسان باشد انجام میشود. ابتدا دهانه رحم را باز میکنند در صورتی که علت خونریزی سقط است محصولات حاملگی را خارج مینمایند و اگر علت خونریزی نا معلوم است از بافت رحم نمونه بیوپسی برمیدارند. اگر پزشک معالج شما ناحیه کشکوک را یافت ممکن از یک بخش یا همه آن را خارج کند و به آزمایشگاه بفرستند. یک آسیب شناس بافت را زیر میکروسکوب آزمایش میکند تا سرطان یا بیماریهای احتمالی دیگر را تشخیص دهند.

2

### مراقبتهای بعد از عمل:

قبل از موارد زیر حتما با پزشک خود مشورت کنید

- 1 انجام کارهای سنگین بعد از عمل جراحی
- 2 داشتن تماس جنسی بعد از عمل جراحی
- 3 در صورتی که عمل بیمار برای خارج کردن محصولات حاملگی انجام شده در صورت تمایل به بارداری مجدد لازم است حاملگی خود را تا 6 ماه به تاخیر بیندازید تا رحم بیمار آمادگی لازم را پیدا کند.

3

**D&C**

بیمارستان نبی اکرم اشنویه  
واحد آموزش به بیمار  
بخش جراحی

مسئول علمی بخش جراحی زنان (دکتر قاسم بگلو)

منابع (ویلیامز)

