

کاتتر یا شالکدون چیست؟



لوله ورید مرکزی یا کاتتر ، لوله باریک و نرمی است که از طریق گردن و یا شانه داخل سیاهرگ مرکزی گردن شما قرار می گیرد و ممکن است موقت یا دائمی باشد. نوع دائم حداکثر تا یک سال و نوع موقت حداکثر تا یک ماه قابل استفاده است .

برای انجام همودیالیز ما به دو رگ نیاز داریم . این لوله دوشاخه دارد ، از یک شاخه خون از بدن خارج می شود و داخل دستگاه دیالیز تصفیه می شود و از شاخه دیگر ، خون تصفیه شده مجدداً وارد بدن می شود.

نحوه گذاشتن لوله ورید مرکزی:

در صورت امکان ، شب قبل از عمل لوله گذاری حمام نمایید. عمل کاتتر گذاری در اتاق عمل و بصورت سرپایی و بدون بیهوشی با بیحسی موضعی انجام می شود.

بعد از بی حسی ، از طریق یک برش کوچک یک سر کاتتر تا نزدیکی قلب هدایت می شود و سر دیگر آن چند سانتیمتر خارج از پوست بخیه می شود. این سر که دو شاخه است همیشه باید توسط پیچ های استریل بسته باشد و فقط پرستار دیالیز بوسیله آن شما را به دستگاه وصل می کند.



مراقبت پس از نصب کاتتر:

یکی از عوارض مهم و شایع کاتتر عفونت است ، برای پیشگیری از عفونت نکات زیر را رعایت نمایید:

👉 دست های خود را خصوصاً پس از توالیت رفتن با آب و صابون بشویید.

👉 از خاراندن پوست اطراف کاتتر و دست زدن به آن پرهیز کنید.

👉 پانسمان کاتتر را خیس نکنید.

👉 بعد از حمام کردن پانسمان کاتتر را تعویض کنید.

👉 پانسمان را در منزل و به صورت غیر استریل تعویض نکنید.

👉 هیچ نوع پمادی را بدون اجازه پزشک روی کاتتر ننمایید.

👉 مواظب باشید کاتتر کشیده و یا تا نشود.

👉 هر گز سرپیچ های دو شاخه را دستکاری نکنید و اگر باز

شده سریع ببندید.



در صورت مشاهده هر یک از علائم زیر به

مرکز درمانی خود مراجعه کنید:

- 1- تب یا لرز
- 2- قرمزی، التهاب یا ترشح چرکی از محل ورود لوله مرکزی به پوست.
- 3- عدم کارایی در حین دیالیز
- 4- اگر بخیه های لوله باز شوند یا لوله از محل خود بیرون آید ، بدون آنکه برای بازگرداندن لوله به جای خود تلاش کنید ، فوراً یک گاز استریل روی آن بگذارید و روی آن چسب محکمی بزنید و به مرکز درمانی مراجعه کنید.


سلامت و تندرست باشید

هرگز بست های آبی و قرمز را دستکاری نکنید و اگر باز شده فوراً ببندید.

مصرف هرگونه داروی تزریقی یا خون گیری از طریق کاتتر ممنوع است.

اگر به هر دلیل لوله ورید مرکزی از گردن شما خارج شد ، سعی نکنید آن را سر جایش برگردانید و محل آن را با یک گاز استریل به مدت 20 دقیقه فشار دهید.


شما و پرستارتان هر دو ملزم به استفاده از ماسک هستید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

بیمارستان نبی اکرم (ص) اشنویه

فکوه مراقبت از کاتتر یا شالکدون



تئیه و تنظیم: واحد آموزش سلامت

تأیید کننده: رئیس علمی بخش

کد NA-H-PE-00

تاریخ تدوین: 1404/09/30

تاریخ بازنگری بعدی: 1405/09/15

منابع: آموزش به بیمار ماری ام. کاتاپیو، کلیه و مجاری ادراری پروتر و سوهارت